

Hobbymatig gehouden

Lammeren		Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen Vlees
Diarree (eerste levensweken)						
Effy-tabs	NR vrij	1 tablet per liter water 50-100 ml toedienen	6x	1	in de bek	0
Diarree						
Vanaf een leeftijd van 3 weken is coccidiose een veel voorkomende oorzaak van diarree bij lammeren. Vanaf een leeftijd van 6 weken kunnen worminfecties de oorzaak zijn. Coccidiose en een worminfectie kunnen aangetoond worden in de mest. Laat eerst mestonderzoek doen op de praktijk en behandel op basis van de uitslag!						
Als de lammeren niet meer drinken, dierenarts bellen voor advies. Vocht is essentieel voor de lammeren, zonodig via een sonde of infuus. Belangrijk is de lammeren melk te blijven geven, afgewisseld met de electrolytenoplossing. Geef de lammeren het vocht in kleine hoeveelheden: 100-150 ml per keer, 6-8 per dag.						
Ontstoken oog *						
Opticlox	RegNL 3432 UDD	1/6 injector per oog	3x	3	in het oog	0
* Vaak is entropion de oorzaak van de ontsteking. De ooglidrand zo naar binnen gekruld en daarmee komen de haren van het ooglid op de oogbol te liggen en zodoende een ontsteking hier-van veroorzaken. Bel uw dierenarts om een krammetje te laten plaatsen, het gaat meestal niet vanzelf over en kan tot ernstige beschadigingen leiden.						
Ontstoken navel						
Depocilline	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	in de spier	7
Gewrichtsontsteking						
Depocilline en pijnstilling	RegNL 4259 UDD zie kopje pijnstilling	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	in de spier	7
Zere bekjes						
Acederm spray	RegNL 5121 vrij	3 sec sprayen	2x	3	op de huid	0
De infectie gaat vanzelf over en meestal hoeft er niet, of alleen met acederm-spray behandeld te worden. Alleen ernstige gevallen behandelen met depocilline. Handschoenen dragen bij het behandelen van de dieren om infectie van uzelf te voorkomen.						
Lammeren & Volwassen dieren						
Longontsteking						
Alamycine <u>en</u> pijnstilling	RegNL 2738 UDD zie kopje pijnstilling	1 ml/ 10 kg	Eénmalig, evt na 48 uur herhalen		in de spier	35
Als schapen longontsteking hebben, is het meestal zomerlongontsteking. Dieren sterven hier vaak binnen een dag aan. Raadpleeg bij plots dode dieren en/of verdenking van zomerlongontsteking altijd de dierenarts. Vaccineren tegen zomerlongontsteking is mogelijk.						
Hersenvliesontsteking						
Alamycine <u>en</u> pijnstilling	RegNL 2738 UDD zie kopje pijnstilling	1 ml/ 10 kg	Eénmalig, evt na 48 uur herhalen		in de spier	35
Pijnstilling						
Rimadyl Cattle**	RegNL 10130 UDA	1 ml/ 35 kg	1x	1	onder de huid	28
Novem**	RegNL 10219 URA	1 ml/ 25 kg	1x	1	onder de huid	22
Vaccinaties						
Volwassen dieren	Vaccinatie tegen:	Wanneer vaccineren:		Herhaling:		
Heptavac*	Het bloed & zomerlongontsteking	4-6 weken voor aflammeren		Jaarlijks		
Footvax*	Rotkreupel	4 weken voor aflammeren		Iedere 4 maanden		
Enzovax	Chlamydia abortus	minimaal 4 weken voor dekken		Elke 4 jaar		
*Advies is volwassen dieren voor het aflammeren te vaccineren ivm doorgeven van de antistoffen.						
Lammeren						
Heptavac	Het bloed & zomerlongontsteking	vanaf 3 weken leeftijd		na 4-6 weken herhalen		
Lammeren en volwassen dieren						
Coxevac*	Q-koorts	vanaf 3 maanden leeftijd		na 3 weken herhalen daarna jaarlijks herhalen		
* Voor bedrijven met een publieke functie is vaccinatie verplicht. Vaccinaties moeten worden toegediend door een dierenarts.						

Lees altijd goed de bijsluiter, wachttijden kunnen wijzigen.

Hobbymatig gehouden

Volwassen dieren	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen Vlees	
Diarree						
Diarree bij volwassen dieren kan worden veroorzaakt door een worminfectie. Worminfecties kunnen aangetoond worden in de mest. Laat mestonderzoek doen op de praktijk en behandel op basis van de uitslag! Regelmatig omweiden kan worminfecties voorkomen. Vraag uw dierenarts om advies!						
Uierontsteking						
Mamyzin** <u>en</u> Pijnstilling	RegNL 8652 UDD zie kopje pijnstilling	1 ml/ 15 kg	1x	3 tot 5	in de spier	15
Uierinjectoren bestemd voor runderen kunnen gebruikt worden maar kunnen ook het slotgat beschadigen en secundaire infecties veroorzaken. Rimadyl/Novem bijspuiten als pijnstiller en ter bevordering van de eetlust.						
Blauw uier						
Pijnstilling	zie kopje pijnstilling	Acuut, uierhelft koud en blauw. Overleg met dierenarts.				
Mamyzin**	RegNL 8652 UDD	1 ml/ 15 kg	1x	3 tot 5	in de spier	15
Baarmoederontsteking						
Alamycine	RegNL 2738 UDD	1 ml/ 10 kg	Eénmalig, evt na 48 uur herhalen		in de spier	35
Ontstoken wond						
Depocilline	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	in de spier	7
Slepende melkziekte						
Propyleenglycol <u>en</u>	RegNL 2628 vrij	30 ml per dier	2x	4	in de bek	0
Calcitad** <u>en</u>	RegNL 3745 UDA	10 ml per dier	1x	3	onder de huid	1
Vitamine B complex**	RegNL 1968 vrij	10 ml per dier	1x	1	in de spier	1
Bij dieren die zeer ernstige slepende melkziekte hebben kan evt. het lammeren opgewekt worden. Overleg hierover met de dierenarts.						
Rotkreupel						
Schoon en droog houden, afblijven. Verdere maatregelen zijn: dieren naar droge, schone stal/wei, voetbaden en vaccineren. Vraag de dierenarts om gericht advies.						
<i>Bij ernstige gevallen:</i>						
Alamycine	RegNL 2738 UDD	1 ml/ 10 kg	Eénmalig, evt na 48 uur herhalen		in de spier	35
Oogontsteking						
Opticlox pijnstilling	RegNL 3432 UDD zie kopje pijnstilling	1/6 injector per oog	3x	3	in het oog	0
Dieren met oogontsteking kunnen het beste apart van de rest gezet worden en in de stal omdat ze niet goed tegen fel licht kunnen. Behandeling met antibiotica heeft niet altijd effect. Bij ernstige oogontsteking wel een pijnstiller spuiten (Rimadyl/Novem). Let op dat de dieren, doordat ze slecht zien, niet verdrinken.						
Zwaar aflammeren						
Depocilline en pijnstilling	RegNL 4259 UDD zie kopje pijnstilling	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	in de spier	7
Ontwormen						
Neem contact op met uw dierenarts voor een passend advies.						

Lees altijd goed de bijsluiter, wachttijden kunnen wijzigen.

** Off label use, let op de langere wachttijden!